

Ce este HPV?

- HPV (*Human Papilloma Virus* sau *Virusul Papiloma Uman*) este un virus comun, care se răspândește cu ușurință prin contactul piele-pe-piele în timpul activității sexuale cu o altă persoană infectată.
- Infecția cu HPV este una dintre cele mai frecvente infecții cu transmitere sexuală.
- Riscul de a contracta o infecție cu HPV de-a lungul vieții este de 70-90%.
- Infecția cu HPV este principala cauză a cancerului de col uterin și a altor câteva tipuri de cancer: de penis, de vulvă, de anus, orofaringian.
- Serotipurile HPV 16 și 18 sunt cele două serotipuri oncogene primare responsabile pentru 71% dintre cancerele de col uterin.

Acum este momentul să te vaccinezi împotriva HPV!

Care sunt factorii de risc pentru contractarea infecției?

- debutul precoce al vieții sexuale
- parteneri sexuali multipli
- fumatul
- utilizarea îndelungată a contraceptivelor orale
- imunosupresie (status HIV+, alte afecțiuni care pot să scadă capacitatea de apărare imună a organismului)
- alte infecții cu transmitere sexuală (chlamydia, herpes simplex 2)

Care sunt simptomele infecției cu HPV?

- Cei mai mulți oameni nu vor ști că sunt infectați (infecția nu dă simptome, este tranzitorie).
- De la momentul infectării și până la apariția cancerului de col uterin trec în general 15-20 de ani, iar simptomele apar în stadii avansate.
- Principalele simptome includ: sângerări vaginale neregulate sau sângerări după actul sexual, durere la contactul sexual, disconfort vaginal sau scurgere mirositoare, dureri de spate, la nivelul picioarelor sau pelvine, oboseală, pierderea în greutate, pierderea poftei de mâncare.
- În formele avansate de boală pot apărea: anemie severă, insuficiență renală, fistule, limfedem.

Vaccinul împotriva HPV:

- previne cancerul de col uterin și alte tipuri de cancer
- este gratuit pentru persoanele de ambele sexe cu vârsta ≥ 11 ani și < 27 de ani
- este compensat 50% pentru persoanele de sex feminin cu vârsta ≥ 27 de ani și < 46 de ani

De ce să te vaccinezi împotriva HPV?

- Trecerea prin infecția cu HPV nu oferă protecție de lungă durată.
- Protecția de durată se obține numai prin vaccinare. Vaccinul nu poate induce apariția bolii, deoarece este non-infecțios.
- Alte măsuri de prevenție primară, precum utilizarea prezervativelor, nu protejează suficient împotriva infecțiilor cu HPV.
- Nu este necesară testarea pentru HPV înainte de administrarea vaccinului.
- Chiar dacă vaccinarea împotriva HPV este administrată în timpul unei infecții HPV existente, vaccinul oferă protecție pentru celelalte serotipuri vaccinale.

